

LACTATO DE RINGER

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR



COMPOSICIÓN

	250 ml	500 ml	1000 ml
Cloruro de sodio	1.5 g	3 g	6 g
Cloruro de potasio	0.075 g	0.15 g	0.3 g
Cloruro de calcio 2 H ₂ O	0.05 g	0.1 g	0.2 g
Lactato de sodio	0.775 g	1.55 g	3.1 g
Agua inyectable c.s.p.	250 ml	500 ml	1000 ml

Equivalente a:

Na+	130.7 mEq/l
K+	4 mEq/l
Ca++	2.7 mEq/l
Cl-	109.7 mEq/l
C3H5O3:	27.5 mEq/l

INDICACIONES:

Lactato de Ringer es solución de Ringer, para uso parenteral en infusión continua. Están indicadas en la restitución y/o mantenimiento de volumen circulante, en pacientes con pérdidas patológicas que requieren de aporte calórico y electrolítico. Entre estas entidades se encuentran: hemorragia quirúrgica o traumática, deshidratación, vómito, hiperhidrosis, insuficiente ingestión de líquidos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Para administración parenteral exclusiva. El envase Liflex® no requiere perforaciones para garantizar el flujo de la solución. El envase Liflex® está provisto de 2 ductos, el ducto que posee tapón de goma autosellante está destinado para la introducción de medicación complementaria, en tanto que el ducto en forma de mariposa, luego de ser desprendido, está destinado para la inserción del equipo de venoclisis. No debe administrarse si la solución no se encuentra perfectamente transparente.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

La dosis a criterio médico deberá administrarse por infusión I.V. continua según el tipo y la magnitud del disturbio.

PRESENTACIÓN:

Envase Liflex® autocolapsible de 1.000 ml, 500 ml y 250 ml con sobrefunda de polietileno



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA