

RADEK SUSPENSIÓN®



Antiparasitario interno oral
0 días de retiro en leche



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:
Fenbendazol 100 mg (10%)
Excipientes c.s.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos y caninos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión.

INDICACIONES

Control de parásitos de bovinos, ovinos y caprinos:

Ostertagia ostertagi, (L3 y L4 incluyendo inhibidas), *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Capillaria*, *Bunostomum*, *Dictyocaulus*, *Chavertia*, *Oesophagostomum*, *Moniezia*.

Parásitos de porcinos:

Hyostrongylus, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ascaris*, *Trichuris*, *Metastrongylus*, *Stephanurus*.

Parásitos de equinos: Grandes estróngilos (*Strongylus*), Pequeños estróngilos (*Oxyuris*), *Parascaris*.

Parásitos de caninos: *Ancylostoma*, *Uncinaria*, *Trichuris*, *Toxocara*,

Toxascaris y *Taenia pisciformis*.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

En bovinos, ovinos, caprinos y porcinos administrar 5 mg de fenbendazol por kg de peso, equivalentes a 5 ml de **radek suspensión** por cada 100 kg de pesos vivo en una sola dosis. En equinos administrar 7.5 mg de fenbendazol por kg de peso, equivalentes a 7.5 ml de **radek suspensión** al 10%, por cada 100 kg de peso en una sola dosis. En caninos administrar 50 mg por kg de peso equivalentes a 5 ml por cada 10 kg de peso, una vez al día por 3 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO

No tiene tiempo de retiro en leche para bovinos.

Los animales destinados para consumo humano, no deben sacrificarse antes de los siguientes períodos de tiempo después de finalizado el tratamiento:

Bovinos 8 días.

Porcinos 3 días.

Ovinos 8 días.

Caprinos 14 días.

FICHA TÉCNICA

CONTRAINDICACIONES

No administrar en caprinos cuando la leche se destine al consumo humano. No administrar en equinos cuando sean para consumo humano.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Envase plástico x 1 litro.

Jeringa plástica x 25 ml.

REGISTROS:

Ecuador 3A1-6287-AGROCALIDAD

Colombia ICA No. 6915-MV

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR