

## SULTRI-PET®



### Antimicrobiano bactericida oral



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

#### COMPOSICIÓN

Cada 5 ml contiene:  
 Trimetoprim 40 mg  
 Sulfametoxazol 200 mg  
 Jarabe aromatizado c.s.

#### FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión.

#### ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Caninos y felinos.

#### INDICACIONES

**SULTRI-PET SUSPENSIÓN** está indicado en el tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a su principio activo en perros y gatos. Se recomienda especialmente a en infecciones entéricas, respiratorias, urinarias y cutáneas causadas por los siguientes microorganismos:

Bacterias: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Nocardia spp.*, *Chlamydia spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Bordetella bronchiseptica* (agente etiológico de la tos de las perreras o kennel cough).  
 Enterobacterias: *Proteus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*

Hongos: *Pneumocystis spp.*

Protozoos: *Toxoplasma spp.*,

*Cryptosporidium spp.*, *Neospora spp.*, *Hepatozoon americanum*.

Coccidias: *Cystoisospora (Isospora) spp.*, *Eimeria spp.*

#### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis general para caninos y felinos es de 15 mg/kg de peso, equivalentes a 1 ml por cada 3 kg de peso del animal cada 12 horas, según el criterio del Médico Veterinario.

#### DURACION DEL TRATAMIENTO

Infecciones sistémicas y bacteremia: 3 a 5 días  
 Infecciones de tejidos blandos, tracto urinario y piodermia: 14 días  
 Coccidiosis: 10 días.  
 Toxoplasmosis: 28 días.  
 Neosporosis: 4 semanas.  
 Otras: Según criterio del Médico Veterinario.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

#### PRECAUCIONES:

Uso Veterinario  
 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 Las sulfonamidas potencializadas pueden provocar hiperparatiroidismo en pacientes caninos, especialmente cuando se llevan a cabo terapias prolongadas. El efecto adverso más importante causado por el sulfametoxazol en perros es la

queratoconjuntivitis seca. En gatos se puede producir anorexia, anemia y agranulocitosis.

#### CONTRAINDICACIONES:

No administrar en perros de raza Doberman pinscher, en pacientes con daño del parénquima hepático, disfunción renal grave, trastornos hematológicos o antecedentes de sensibilidad a las sulfonamidas. Se desaconseja su uso en perros con urolitiasis, predispuestos a formar urolitos o con orina muy concentrada.

#### TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

#### ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.

#### PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

#### PRESENTACIÓN

Frasco x 100 ml.

#### REGISTROS:

Ecuador 2C1-14482-AGROCALIDAD

#### ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR