

TRAMICIN L.A.®

FICHA TÉCNICA



Antibiótico y antiinflamatorio inyectable de larga acción



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:

| | |
|-----------------------------|--------|
| Oxitetraciclina base | 200 mg |
| Diclofenaco sódico | 5 mg |
| 2-pirrolidona | 400 mg |
| Vehículo y excipientes c.s. | |

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos

INDICACIONES

En bovinos, ovinos, caprinos y cerdos en el tratamiento de procesos infecciosos producidos por gérmenes gramnegativos, grampositivos y rickettsias, tales como anaplasmosis, septicemias, procesos neumónicos bacterianos y complicaciones bacterianas de infecciones respiratorias de origen viral, aborto enzoótico ovino, síndrome MMA en cerdas, mastitis sistémicas, brucelosis, carbón sintomático y bacteridiano, procesos gastrointestinales, etc. y en general en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a su principio activo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

tramycin L.A. se administra en dosis de 1

ml por cada 10 kilos de peso. En lechones aplicar 1 ml por animal, aunque su peso sea inferior a 10 Kg. Cuando la dosis sea superior a 20 ml en bovinos, 10 ml en porcinos y 5 ml en ovinos y caprinos, se debe distribuir la dosis en dos puntos diferentes.

Una sola inyección mantiene niveles terapéuticos hasta por 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

En bovinos, ovinos, caprinos y cerdos mayores de 10 Kg: por vía intramuscular profunda. En cerdos menores de 10 Kg por vía subcutánea detrás de la oreja.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Puede aparecer en el punto de inyección una inflamación que desaparece al cabo de pocos días. En el caso excepcional de presentarse una reacción alérgica, consulte al Médico Veterinario.

La inyección accidental intravenosa puede dar lugar a un shock con colapso cardiovascular; en estos casos administrar adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 21 días antes del sacrificio de los animales. La leche de los animales

tratados no debe darse al consumo humano hasta 7 días después de la última aplicación.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses

PRESENTACIÓN

Frascos x 20 ml y 100 ml.

REGISTRO:

Ecuador 2C1-8939-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE- ECUADOR