

VETERCILIN L.A. PLUS®



Combinación antibiótica – antiinflamatoria inyectable de larga acción y amplio espectro



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada frasco con polvo contiene:

Penicilina G Sódica 1'500.000 UI
 Penicilina G Procaínica 1'500.000 UI
 Penicilina G Benzatínica 3'000.000 UI
 Estreptomicina Sulfato
 equivalente en base 6 g

Diluyente:

Diclofenaco Sódico (15 mg/ml) 20 ml

Después de reconstituido, cada frasco de **vetercilín L.A. Plus** contiene 28 ml de suspensión antibiótica.

Cada ml de esta suspensión contiene:

214.286 UI de penicilinas
 214,3 mg de estreptomicina y
 10,7 mg de diclofenaco sódico.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para reconstituir suspensión.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

INDICACIONES

Para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la penicilina y la estreptomicina. Se recomienda especialmente en: carbón bacteriano, carbón sintomático, erisipela, tétanos, pododermatitis

(panadizo), disentería vibrionica,
 poliartritis infecciosa, neumonía,
 pielonefritis, hepatitis necrótica
 infecciosa, difteria, conjuntivitis,
 peritonitis, otitis externa, adenitis equina,
 complicaciones de fiebre aftosa, muermo
 y tuberculosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Agregue la totalidad del diluyente (20 ml) al frasco con el antibiótico en polvo y administre 1 ml por cada 20 kilos de peso vivo del animal. Normalmente una sola aplicación de **vetercilín L.A. Plus** es suficiente, pero de acuerdo con el estado del animal y criterio profesional, se puede aplicar una segunda dosis a las 72 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 En caso de reacción anafiláctica administrar adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar en animales destinados al consumo humano 30 días antes del sacrificio. La leche de hembras tratadas sirve para consumo humano luego de 72 horas de suspendido el tratamiento

CONTRAINDICACIONES:

No administrar por vía intravenosa, subcutánea u oral.
 No administrar a animales con deficiencias renales.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO:

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz. Una vez realizada la dilución, usar lo más pronto posible: se mantiene estable durante 24 horas a temperatura ambiente y en refrigeración, 3 - 7° C. durante 5 – 7 días.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 6 millones de UI de penicilinas y 6 g de estreptomicina con su diluyente (300 mg de diclofenaco).

REGISTRO:

Ecuador 2C4-8827-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR